



森下仁丹

報道関係各位

2013年11月12日

森下仁丹株式会社

女性の6割*が気になる**体(足・顔・手など)の「むくみ」**を改善する生薬エキス製剤

※森下仁丹調べ




『腎仙散®(ジンセンサン)』(第2類医薬品)

2013年11月25日(月)より新発売

森下仁丹株式会社(本社:大阪市中央区/代表取締役社長:駒村純一)は、セルフメディケーションブランドの「メディケア®シリーズ」から、15種類の生薬を配合し、足や手、顔などのむくみ、利尿減少の改善に働きかける生薬エキス製剤「腎仙散®(ジンセンサン)」(第2類医薬品 価格:2,310円/税込)を、2013年11月25日(月)より新発売します。

「腎仙散」は、利尿作用、抗炎症作用などの働きを持つ15種類の生薬を配合しており、腎臓の老廃物の排泄を促進することで気になる足や顔などのむくみを改善します。弊社が女性を対象に実施した調査(下図参照)では、全体の60.8%が「むくみが気になったことがある」と回答しており、むくみは女性に一般的な悩みであることがわかります。本商品はむくみなどの諸症状が起こる原因を考え、内側から自然に治るよう働きかけます。



販売名:腎仙散®(ジンセンサン)

価格:2,310円(税込)

<第2類医薬品>



「腎仙散」に配合している15種類の生薬

<p>タクシャ(沢瀉)</p>  <p>利尿作用</p>	<p>ソウジュツ(蒼朮)</p>  <p>利尿作用 抗炎症作用</p>	<p>サンシシ(山梔子)</p>  <p>抗炎症作用 鎮痛作用</p>	<p>ボウイ(防己)</p>  <p>抗炎症作用 鎮痛作用</p>	<p>ウワウルシ</p>  <p>利尿作用 抗菌作用</p>
<p>チョレイ(猪苓)</p>  <p>利尿作用 抗炎症作用</p>	<p>ケイヒ(肉桂皮)</p>  <p>抗菌作用</p>	<p>シャクヤク(芍薬)</p>  <p>抗炎症作用 抗菌作用 鎮痛作用</p>	<p>ニワトコ</p>  <p>利尿作用 抗炎症作用 鎮痛作用</p>	<p>シャゼンシ(車前子)</p>  <p>利尿作用</p>
<p>ブクリョウ(茯苓)</p>  <p>利尿作用</p>	<p>インチンコウ(茵陳蒿)</p>  <p>利尿作用 抗炎症作用 抗菌作用</p>	<p>ジオウ(地黄)</p>  <p>利尿作用</p>	<p>キササゲ</p>  <p>利尿作用</p>	<p>ボウコン(茅根)</p>  <p>利尿作用 抗炎症作用 鎮痛作用</p>

※イラストは生薬の元の植物をあらわしています。

※商品画像をご入用の方は、お手数ですが h-nagao@kyodo-pr.co.jp(共同PR長尾)もしくは下記連絡先までご連絡頂ければ幸いです。

【リリースについてのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 広報宣伝G 担当:磯部・本山 TEL:06-6761-1134 FAX:06-6761-8108

共同PR株式会社 第四業務局 担当:長尾・呉 TEL:03-3571-5275 FAX:03-3574-1005

【お客様からのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 TEL:06-6761-0003



森下仁丹 〒540-8566 大阪市中央区玉造一丁目2番40号 TEL:(06)6761-1134 FAX:(06)6761-8108

【「腎仙散」商品概要】

販 売 名	腎仙散®(ジンセンサン)																																																
分 類	第2類医薬品																																																
薬 効 分 類	生薬エキス製剤																																																
剤 形	散剤																																																
容 量	18包(1.5g×18)																																																
価 格	2,310円(税込)																																																
発 売 日	2013年11月25日(月)																																																
成 分 ・ 分 量	<p>1包1.5g・20包中に下記の生薬より製したエキス25.0g含有</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">タクシャ</td> <td style="width: 10%;">.....</td> <td style="width: 10%;">6.0g</td> <td style="width: 10%;">ジオウ</td> <td style="width: 10%;">.....</td> <td style="width: 10%;">6.0g</td> </tr> <tr> <td>チヨレイ</td> <td>.....</td> <td>6.0g</td> <td>ボウイ</td> <td>.....</td> <td>6.0g</td> </tr> <tr> <td>ブクリョウ</td> <td>.....</td> <td>8.0g</td> <td>ニワトコ</td> <td>.....</td> <td>8.0g</td> </tr> <tr> <td>ソウジュツ</td> <td>.....</td> <td>7.0g</td> <td>キササゲ</td> <td>.....</td> <td>8.0g</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ</td> <td>.....</td> <td>6.0g</td> <td>ウワウルシ</td> <td>.....</td> <td>10.0g</td> </tr> <tr> <td>インチンコウ</td> <td>.....</td> <td>5.0g</td> <td>シャゼンシ</td> <td>.....</td> <td>6.0g</td> </tr> <tr> <td>サンシン</td> <td>.....</td> <td>5.0g</td> <td>ボウコン</td> <td>.....</td> <td>6.0g</td> </tr> <tr> <td>シャクヤク</td> <td>.....</td> <td>7.0g</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>添加物としてカルメロース Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有します。</p>	タクシャ	6.0g	ジオウ	6.0g	チヨレイ	6.0g	ボウイ	6.0g	ブクリョウ	8.0g	ニワトコ	8.0g	ソウジュツ	7.0g	キササゲ	8.0g	ケイヒ	6.0g	ウワウルシ	10.0g	インチンコウ	5.0g	シャゼンシ	6.0g	サンシン	5.0g	ボウコン	6.0g	シャクヤク	7.0g			
タクシャ	6.0g	ジオウ	6.0g																																												
チヨレイ	6.0g	ボウイ	6.0g																																												
ブクリョウ	8.0g	ニワトコ	8.0g																																												
ソウジュツ	7.0g	キササゲ	8.0g																																												
ケイヒ	6.0g	ウワウルシ	10.0g																																												
インチンコウ	5.0g	シャゼンシ	6.0g																																												
サンシン	5.0g	ボウコン	6.0g																																												
シャクヤク	7.0g																																															
効 能 ・ 効 果	ムクミ、利尿減少、膀胱炎、腎炎、ネフローゼ、腎盂炎																																																
用 法 ・ 用 量	通常成人1回1包・1日3回・食間に服用してください。8歳～15歳は1回1/2包・4～7歳は1回1/3包ずつ服用してください。																																																
使 用 上 の 注 意	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 胃腸の弱い人(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5) 次の症状のある人: 食欲不振、吐き気・嘔吐 2. 服用に際しては、説明文書をよくお読みください。 3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 4. 小児の手の届かない所に保管してください。 5. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) 6. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。 																																																