



森下仁丹

報道関係各位

2013年3月27日  
森下仁丹株式会社

必要な時にすぐ飲める液体タイプの乗物酔い対策商品



「ポードシリーズ」に

新たに「1本入り」と「学童用」を追加

2013年4月1日(月)より全国のドラッグストアにて発売


森下仁丹株式会社(本社:大阪市中央区/代表取締役社長:駒村純一)は、セルフメディケーションブランドの「メディケア®シリーズ」から、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛を予防、緩和する「ポード(2本入り/5本入り)」の新ラインアップとして、携帯に便利な「ポード(1本入り)」(第2類医薬品 価格:420円/税込)と、子供向けに処方した「学童用ポード内服液(2本入り)」(第2類医薬品 価格:630円/税込)を、2013年4月1日(月)より全国のドラッグストアにて発売します。



新ラインアップ

ポード(1本入り)  
価格:420円(税込)

「1本でいいから価格を抑えたい」  
「携帯性を考えると1本が便利」  
「1本だけすぐに欲しい時がある」  
⇒お客様の声に応え  
1本入りを新発売



新ラインアップ

学童用ポード内服液(2本入り)  
価格:630円(税込)

✓ 飲みやすいイチゴ風味  
✓ 大人より乗物酔いが多い\*  
こどものために、1本飲みきりタイプにしました。

※直近1年以内の乗り物酔いの経験は、大人の24.0%に比べ、こども(7~14歳)は75.8%と3倍以上(N=504 森下仁丹調べ)

《「ポードシリーズ」商品特徴》

■少量タイプなのに成分量は充実

乗物酔いでつらいときでも飲みやすい少量タイプ(10mL)。有効成分(スコポラミン臭化水素酸塩水和物、クエン酸カフェイン、ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド※)配合で乗り物酔いにしっかり働きます。

※学童用ポード内服液にのみ配合しています。

■液体タイプ

乗物に乗ってからの服用でも効果があります。

■体内にとどまる時間が短い、やさしい処方

効果の持続は4~6時間。必要なときだけ作用し、お子様の体にも負担がかかりにくい処方です。

✓ パッケージをリニューアル

1969年から長年にわたり販売してきた「ポード」のパッケージデザインを今回42年ぶりに一新しました。

旧パッケージ



新パッケージ



※商品画像をご入用の方は、お手数ですが[h-nagao@kyodo-pr.co.jp](mailto:h-nagao@kyodo-pr.co.jp)(共同PR長尾)もしくは下記連絡先までご連絡頂ければ幸いです。

【リリースについてのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 広報宣伝部 担当:磯部・大北 TEL:06-6761-1134 FAX:06-6761-8108  
共同PR株式会社 第四業務局 担当:長尾・呉 TEL:03-3571-5275 FAX:03-3574-1005

【お客様からのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 TEL:06-6761-0003



森下仁丹 〒540-8566 大阪市中央区玉造一丁目2番40号 TEL:(06)6761-1134 FAX:(06)6761-8108

## 乗物酔いのメカニズムとポード内服液の働き



### 【「ポード」】(1本、2本、5本入り)商品概要

販売名	ポード
分類	第2類医薬品
容量	10mL×1本、10mL×2本、10mL×5本
価格	1本入り:420円(税込)、2本入り:630円(税込)、5本入り:1,365円(税込)
発売日	2013年4月1日(月)
成分・分量 (1瓶・10mL中)	スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.22mg、クエン酸カフェイン 80mg、ピリドキシリン塩酸塩 20mg、添加物: D-ソルビトール、デヒドロ酢酸 Na、香料、エタノール、バニリン
効能・効果	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
用法・用量	1回量: 15歳以上…1瓶(10mL)、7歳以上15歳未満…1/2瓶(5mL) 乗物酔いの予防には乗車船30分前に服用してください。なお必要に応じて追加服用する場合には前記用量を4時間以上の間隔をおき服用してください。1日2回まで服用できます。
注意	<ol style="list-style-type: none"> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。</li> <li>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。緑内障、心臓病</li> <li>服用に際しては、添付文書をよく読んでください。</li> <li>直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。</li> <li>小児の手の届かない所に保管してください。</li> <li>使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。</li> </ol>

【「学童用ポード内服液(2本入り)」商品概要】

販 売 名	学童用ポード内服液
分 類	第2類医薬品
容 量	10mL (2本入り)
価 格	630円(税込)
発 売 日	2013年4月1日(月)
成 分 ・ 分 量 (1瓶・10mL中)	スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.125mg、クエン酸カフェイン 50mg、 ピリドキシリン塩酸塩 12.5mg、ニコチン酸アミド 12.5mg、添加物：D-ソルビトール、 精製白糖、デヒドロ酢酸 Na、香料、エタノール、バニリン
効 能 ・ 効 果	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
用 法 ・ 用 量	1 回量：7 歳以上 15 歳未満 ……1 瓶(10mL) 乗物酔いの予防には乗車船30 分前に服用してください。なお必要に応じて追加 服用する場合には前記用量を 4 時間以上の間隔をおき服用してください。1 日 2 回まで服用できます。
注 意	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。</li> <li>2. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。排尿困難(6) 次の診断を受けた人。緑内障、心臓病</li> <li>3. 服用に際しては、添付文書をよく読んでください。</li> <li>4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。</li> <li>5. 小児の手の届かない所に保管してください。</li> <li>6. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。</li> </ol>