

～メディケアブランドに口内炎治療薬2商品が登場！～



## 『デンタルクリーム』 『クールスロート』 9月21日(火)新発売！

森下仁丹株式会社(本社:大阪市中央区/代表取締役:駒村純一)は、口内炎の痛みをダイレクトにとることができる軟膏「デンタルクリーム(第2類医薬品)」(価格:1,029円/税込)と、口内炎によるはれや炎症をしずめ、炎症効果のみならず、手軽さも兼ね備えたスプレー「クールスロート(第3類医薬品)」(価格:735円/税込)を2010年9月21日(火)より薬局・薬店にて新発売します。

### 【デンタルクリーム 商品特徴】

- 痛みに対して効果を体感できる。
- 2種類の痛み止め成分配合(ジブカイン塩酸塩、アミノ安息香酸エチル)でつらい痛みがしっかりおさまる。
- 患部に直接塗れる軟膏タイプ。
- 食事や会話がつらい時に痛くてしみる感覚をおさえる。

#### 《商品概要》

商品名	デンタルクリーム
容量	5g
価格	1,029円(税込)
効能・効果	口内炎、口角炎、虫歯、歯根炎、歯肉炎等による歯痛、歯槽膿漏



### 【クールスロート 商品特徴】

- 消炎成分アズレンが炎症・はれをしずめ、口内炎を治す。
- 塗る・貼る手間がなく、届きにくい患部にも簡単に塗れる。
- 手を汚さず清潔・手軽に治療できるスプレータイプ。
- 爽やかにうるおうペパーミント風味。

#### 《商品概要》

商品名	クールスロート
容量	6ml
価格	735円(税込)
効能・効果	口内炎、のどの炎症によるのどのあれ、のどのいたみ、のどのはれ、のどの不快感、声がれ



### 【本件に関するお問い合わせ】

森下仁丹株式会社 広告・宣伝グループ 磯部・大北 TEL:06-6761-1134 FAX:06-6761-8108  
共同PR株式会社 第五業務局 担当:長尾・林 TEL:03-3571-5275 FAX:03-3574-1005

### 【お客様からのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 06-6761-0003




### 【参考資料】

弊社が2010年4月に15～59歳の男女に行った「病気に関する調査」によると、約5割(推計約3,500万人)の方がこの1年間で口内炎を患っていることが分かりました。これにより、成人の2人に1人が口内炎になっており、まさに国民病のひとつになりつつあります。しかし、実際のところ、約7割の方は、口内炎治療薬を使用していない状況です。その理由としては、商品の認知不足もあげられますが、痛みを我慢したり、治療薬の手間に不便さを感じていることが分かりました。そこで、治療薬の認知をあげる活動を行うと共に、手軽に手を汚さず治療できるスプレータイプの「クールスロート」を新発売致します。


また、別の調査によると、口内炎治療薬の使用者が求める効果として、7割もの方が痛みを対処できる商品を探めていることが分かりました。そこで、痛み止め成分を2種類配合した「デンタルクリーム」を新発売致します。

### 《直近一年の間に口の中にできた病気》

**この一年間で成人の2人に1人が口内炎を患っています！**




### 《口内炎患者が持つ治療薬に対する使用意欲》



## 《口内炎患者が治療薬に求める効果》

**口内炎患者は、治療薬に即効性を求めている！**



2010年4月

「病気に関する調査」

N=口内炎罹患者(直近1年)

購入者100名非購入者100名

森下仁丹調べ

## 【商品概要】

商品名	デンタルクリーム
分類	第2類医薬品
形状	軟膏
容量	5g
成分・分量(100g中)	ジブカイン塩酸塩:1.0g、アミノ安息香酸エチル:0.3g、 塩化セチルピリジニウム:0.1g、メントール:0.1g 添加物として、ポリソルベート 80、ポビドン、ゲル化炭化水素、香料を 含有します。
効能・効果	口内炎、口角炎、虫歯、歯根炎、歯肉炎等による歯痛、歯槽膿漏
用法・用量	1日数回、適量を清潔な指先、または脱脂綿につけて、患部に塗擦して 下さい。虫歯には、そのくぼみ並びに歯肉に塗布して下さい。
注意	(1)小児の手の届かないところに保管して下さい。(2)使用に際しては、 添付文書をよく読んで下さい。(3)直射日光の当たらない湿気の少ない 涼しい所に密栓して保管して下さい。

商品名	クールスロート
分類	第3類医薬品
形状	液(スプレー)
容量	6ml
成分・分量(1ml中)	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物:0.2mg 添加物として、クエン酸 ナトリウム水和物、キシリトール、サッカリンナトリウム水和物、マクロゴ ール、エタノール、香料を含有する。
効能・効果	口内炎、のどの炎症によるのどのあれ、のどのいたみ、のどのはれ、 のどの不快感、声がれ
用法・用量	1日数回適量を患部に噴射塗布して下さい。
用法・用量に関する注意	(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)口を開けて患部に噴射口を向け て、軽く息を吐きながら噴射して下さい。(3)噴射塗布のみに使用し、内 服しないで下さい。(4)目に入らないように注意して下さい。万一目に入 った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を 受けて下さい。(5)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のも とに使用させて下さい。
注意	(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児 の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下 さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4)薬液がこぼれ衣 類等に付着した場合は、水又は洗剤で洗って下さい。(5)液が出ない時 は、液が出るまで数回空押しして下さい。(6)火気に近づけないで下さい。 (7)使用期限の過ぎた製品は、使用しないで下さい。